

DESHERBAGE DES PARCELLES EN PRÉ-LEVÉE SUR PAILLE



Désherber en prélevée sur paille c'est :

Réduire le stock de graines dans le sol

Repousser la levée des adventices après la coupe

Plus facile pour éliminer le *Rottboellia cochinchinensis* (herbe à riz)



Les solutions de traitement existant en Guadeloupe en 2019 avec des produits homologués en canne à sucre sont les suivantes :

Produit 1	Produit 2	Cible	Commentaire
Merlin 133 g/ha (isoxaflutole) Action <u>racinaire</u> herbicide non sélectif	Prowl 400 3 l/ha (pendiméthaline) Action sur les <u>organes souterrains</u> entre la germination et la levée Herbicide sélectif	<i>Rottboellia cochinchinensis</i> (herbe à riz) et autres Monocotylédones de petites tailles La pendiméthaline agit sur certaines dicotylédones de petites tailles	L'application doit être réalisée en prélevée stricte des <u>graminées</u> dans les 45 jours qui suivent la récolte. Attention, si levée de la canne faire traitement en localisé dans les inter-rangs. Si levée de lianes utiliser un anti-dicotylédones (Dicopur 600, Starane 200 ou autre). Efficacité de l'isoxaflutole améliorée sur sol vertisol et peu profond.
Sencoral UD 1,25 kg/ha (métribuzine) Action <u>racinaire</u> Action foliaire faible Herbicide sélectif	Prowl 400 3 l/ha (pendiméthaline) Action sur les <u>organes souterrains</u> entre la germination et la levée Herbicide sélectif	<i>Rottboellia cochinchinensis</i> (herbe à riz) et autres Monocotylédones de petites tailles La métribuzine agit sur certaines dicotylédones de petites tailles	L'application doit être réalisée en prélevée stricte des <u>graminées</u> dans les 45 jours qui suivent la récolte. Si levée de lianes utilisez un anti-dicotylédones (Dicopur 600, Starane 200 ou autre).
Camix 3.75 l/ha (S-métolachlore + mésotrione) Action <u>racinaire</u> et <u>foliaire</u> Herbicide sélectif		Monocotylédones de petites tailles et dicotylédones de petites tailles. <i>Rottboellia cochinchinensis</i> (herbe à riz) si adjonction de isoxaflutole , pendiméthaline ou métribuzine.	Le Camix peut être utilisé seul si l'enherbement de départ n'est pas important. Il peut être mélangé à l'isoxaflutole, à la pendiméthaline ou à la métribuzine. L'application doit être réalisée en prélevée stricte des <u>graminées</u> dans les 45 jours qui suivent la récolte.

Il faut appliquer les produits sur paille humide pour une plus grande efficacité

Attention : Respecter la ZNT mentionnée sur l'emballage des produits.

- Le Prowl 400 et le Sencoral UD ont un IZNT¹ de 20 m.

¹ IZNT : l'Indicateur de Zone Non Traitée exprime une distance à respecter vis-à-vis des points d'eau lors des pulvérisations.

Pour toutes informations, contactez vos techniciens dans votre SICA

CTCS Guadeloupe - édition avril 2019